

গোপাঞ্চাংগ

উদ্ভিদৰ ছবি আৰু স্প্ৰে সূচী

(Dlog Technologies, Chennai - 600033 ৰ পৰা)

ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

ধান ঘেঁহু আৰু সকলো শস্যৰ বাবে
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

Brinjal (কণী গছ) ৰ বাহিৰে আন সকলো শাক-পাচলিৰ বাবে
১০ বা ১২ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

ক্লাষ্টাৰ বীন আৰু অন্যান্য ধল জাতৰ উদ্ভিদৰ বাবে, শস্য
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



যদি উদ্ভিদ অস্বাস্থ্যকৰ হয় বা পোক-পৰুৱা, কীট-পতংগ, কৃমিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত বা বেট্টেৰিয়াজনিত ৰোগ বা ভাইৰাছজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেন্তে মাত্ৰ ৩ বাৰ, প্ৰতি ৭ দিনৰ মূৰে মূৰে এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে।

ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

ব্ৰিঞ্জাল আৰু অন্যান্য ফুলৰ গছৰ বাবে
৭ বা ৮ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

বংগ গ্ৰাম, জিংগেলি আৰু অন্যান্য ৯০ দিনৰ শস্যৰ বাবে
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

পিহি লোৱা বাদাম, সূৰ্যমুখী আৰু অন্যান্য তেলবীজ গছৰ বাবে
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

পিঁয়াজৰ বাবে, আৰু অন্যান্য শিপাৰ শাক-পাচলিৰ বাবে
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

পেঁপা আৰু ক'ক' গছৰ বাবে
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

কফি চাহ আৰু অন্যান্য এষ্টেট বাগিচাৰ বাবে
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

নাৰিকল, আৰ্কানাট, ক'ক' আৰু পাম আৰু সকলো ওখ গছৰ বাবে
১৫ বা ৩০ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

ডালিম, পেঁপা আৰু অন্যান্য ফলমূলৰ গছৰ বাবে
১৫ বা ৩০ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

গোলাপ, মেৰিগোল্ড আৰু অন্যান্য ফুলৰ গছৰ বাবে
৭ বা ৮ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

আদা, হলুদ আৰু অন্যান্য শিপাৰ শাক-পাচলিৰ বাবে
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

চুপাৰি আৰু অন্যান্য ১ বছৰৰ শস্যৰ বাবে
১৫ বা ২০ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

কুমলীয়া ডালিম আৰু অন্যান্য লতা শাক-পাচলিৰ বাবে
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

কাৰেলাৰ বাবে স্লেঞ্চ গাৰ্ড, ৰিজ গাৰ্ড আৰু অন্যান্য লতা
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

উৰাদ ধল (Blackgram) ৰ বাবে Moong dhal আৰু অন্যান্য ধল
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

নেমু, ড্ৰামষ্টিক আৰু অন্যান্য শাক-পাচলি গছৰ বাবে
১৫ বা ৩০ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

কুঁহিয়াৰ, জলকীয়া আৰু অন্যান্য বাজৰা শস্যৰ বাবে
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

বিলাহী, বুটমাহ, মূলা, শলগ আদিৰ বাবে।
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

আলু, ফুলকৰি আদিৰ বাবে।
১২ বা ১৫ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

ধনীয়া আৰু অন্যান্য পাতল সেউজীয়াৰ বাবে

১০ বা ১২ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

সপোটা, আমলা আৰু অন্যান্য ফলমূলৰ গছৰ বাবে

১৫ বা ৩০ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক

অতি উচ্চ উৎপাদন

আপেল, নাচপতি আৰু অন্যান্য ফলৰ গছৰ বাবে

১৫ বা ৩০ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

মৰিচা, কপাহ আৰু অন্যান্য ৬ মাহৰ শস্যৰ বাবে
১৫ বা ২০ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



ৰাসায়নিক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰক
অতি উচ্চ উৎপাদন

জলবগৰী, কস্তুৰী বগৰী আৰু অন্যান্য ৬০ দিনৰ শস্যৰ বাবে
১০ বা ১২ দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে



যদি উদ্ভিদ অস্বাস্থ্যকৰ হয় বা পোক-পৰুৱা, কীট-পতংগ, কৃমিৰ
দ্বাৰা আক্ৰান্ত বা বেণ্টেৰিয়াজনিত ৰোগ বা ভাইৰাছজনিত ৰোগত
আক্ৰান্ত হয় তেন্তে মাত্ৰ ৩ বাৰ, প্ৰতি ৭ দিনৰ মূৰে মূৰে এবাৰ স্প্ৰে
কৰিব লাগে।