

Bengali Plant Pictures Pdf 1626

গোপত্রচঙ্গা

গাছরে ছবি ও স্পুরে করার সময়সূচী

(ডলিগ টকেনেংলজসি, চনেনাই - □□□□□ থকে)

রাসায়নকি কীটনাশক পরহির করুন

খুব উচ্চ ফলন

ধান, গম এবং সকল শস্যরে জন্ষ

প্রতি ৭৭ বা ৭৭ দিনে একবার স্পুরে করা প্রয়োজন।



রাসায়নকি কীটনাশক পরহির করুন

খুব উচ্চ ফলন

বগুন ছাড়া অন্য সব সবজরি জন্ষ

প্রতি ৭৭ বা ৭৭ দিনে একবার স্পুরে করা প্রয়োজন।



গাছপালা অসুস্থ হলে অথবা পোকামাকড়, কীট, কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হলে বা ব্যাকটেরিয়াজনিত বা ভাইরাসজনিত রোগে ভুগলে, প্রতি ৭ দিনে একবার করে মাত্র ৩ বার স্প্রে করুন।

রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

গুচ্ছ শমি এবং অন্যান্য ডাল জাতের গাছেরে জন্ম ফসল
প্রতি ৩৩ বা ৩৩ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

বগুন এবং অন্যান্য ফুলেরে গাছেরে জন্ম
প্রতি ৩ বা ৩ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

ছোলা, তলি এবং অন্যান্য ৩৩ দিনেরে ফসলেরে জন্ম
প্রতি ৩৩ বা ৩৩ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

চনিাবাদাম, সূর্যমুখী এবং অন্যান্য তলৈবীজ উদ্ভদরে জন্য
প্রতি ৩৩ বা ৩৩ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

পয়োজ এবং অন্যান্য মূল জাতীয় সবজরি জন্য
প্রতি ৩৩ বা ৩৩ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

পপে এবং কোকো গাছরে জন্য
প্রতি ৩৩ বা ৩৩ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

কফি, চা এবং অন্যান্য এস্টেটে প্ল্যান্টেশনের জন্য
প্রতি ১০০ বা ১২০ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

নারকেলে, আরকনাট, ককো এবং পাম ও সকল লম্বা গাছের জন্য
প্রতি ১০০ বা ১২০ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

ডালমি, পয়োরা এবং অন্যান্য ফলের গাছের জন্য
প্রতি ১০০ বা ১২০ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

গোলাপ, গাঁদা এবং অন্যান্য ফুল গাছের জন্য
প্রতি ১০ বা ১৫ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

আদা, হলুদ এবং অন্যান্য মূল জাতীয় সবজির জন্য
প্রতি ১০ বা ১৫ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

আখ এবং অন্যান্য এক বছর ময়াদী ফসলের জন্য
প্রতি ১০ বা ১৫ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

কুমড়া এবং অন্যান্য লতানো সবজির জন্য
প্রতি ৭৭ বা ৭৭ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

করলা, স্নকে গার্ড, রজি গার্ড এবং অন্যান্য লতানো গাছের জন্য
প্রতি ৭৭ বা ৭৭ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

উরদ তাল (কালোগ্রাম) মুগ বাল এবং অন্যান্য তালের জন্য
প্রতি ৭৭ বা ৭৭ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

লবু, সজনো এবং অন্যান্য সবজি গাছের জন্য
প্রতি ১০ বা ১৫ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

ভুট্টা, জোয়ার এবং অন্যান্য বাজরা ফসলের জন্য
প্রতি ১০ বা ১৫ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

গাজর, বটি, মুলা, শালগম ইত্যাদির জন্য।
প্রতি ১০ বা ১৫ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

আলু, ফুলকপি ইত্যাদির জন্য।

প্রতি ২০ বা ২২ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

ধনুয়া এবং অন্যান্য শাকসবজির জন্য

প্রতি ২০ বা ২২ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

সপোটা, আমলকী এবং অন্যান্য ফলের গাছের জন্য

প্রতি ২০ বা ২২ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

আপলে, নাশপাতী এবং অন্যান্য ফলরে গাছরে জন্য
প্রতি ১০ বা ১৫ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

মরিচি, তুলা এবং অন্যান্য ছয় মাস বয়সী ফসলরে জন্য
প্রতি ১০ বা ১৫ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



রাসায়নিক কীটনাশক পরহিার করুন

খুব উচ্চ ফলন

তরমুজ, খরমুজ এবং অন্যান্য ১০ দিনে ফসলরে জন্য
প্রতি ১০ বা ১৫ দিনে একবার স্প্রে করা প্রয়োজন।



গাছপালা অসুস্থ হলে অথবা পোকামাকড়, কীট, কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হলে বা ব্যাকটেরিয়াজনিত বা ভাইরাসজনিত রোগে ভুগলে, প্রতি ৭ দিনে একবার করে মাত্র ৩ বার স্প্রে করুন।