

## ಗೋಪಂಚಾಂಗ

ಸಸ್ಯಗಳ ಪಿಕ್ಯೂಟ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ  
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು

(ಡಾಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಚೆನ್ನೈ - 600033 ನಿಂದ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಭತ್ತ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಬದನೆಕಾಯಿ (ಮೊಟ್ಟೆ ಗಿಡ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ  
10 ಅಥವಾ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಲ್ ವಿಧದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ಬೆಳೆಗಳು  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ  
7 ಅಥವಾ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕಡಲೆ ಕಾಳು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ 90 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ನೆಲಗಡಲೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೇರು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಬಾಳೆ ಪಪಾಯ ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಗಿಡಗಳಿಗೆ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಸ್ಪೀಟ್ ತೋಟಗಳಿಗೆ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅರ್ಕನಟ್, ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಗೆ  
15 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ದಾಳಿಂಬೆ, ಪೇರಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ  
15 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಗುಲಾಬಿ, ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ  
7 ಅಥವಾ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

# ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೇರು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

# ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಇತರ 1 ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ  
15 ಅಥವಾ 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

# ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕರೇಲಾ, ಸ್ನೇಕ್ ಗಾರ್ಡ್, ರಿಡ್ಜ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಉರಾದ್ ಧಲ್ (ಬ್ಲಾಕ್‌ಗ್ರಾಮ್) ಮೂಂಗ್ ಧಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾಲ್‌ಗಾಗಿ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ನಿಂಬೆ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿ ಮರಗಳಿಗೆ  
15 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

# ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಜೋಳ, ಸೋರ್ಗಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

# ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಟರ್ನಿಪ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ.  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

# ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಹೂಕೋಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ.  
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ  
10 ಅಥವಾ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಸಪೋಟಾ, ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ  
15 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಸೇಬು, ಪೇರಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ  
15 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ  
15 ಅಥವಾ 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

## ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 60 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ  
10 ಅಥವಾ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.

