

# Malayalam Plant Pictures Pdf 1626

ഗോപഞ്ചാംഗ

സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും സ്പ്രേ  
ഷെഡ്യൂളുകളും

(ഡോക്ടർ ടെക്നോളജീസ്, ചെന്നൈ - 600033 ൽ നിന്ന്)

രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക

വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്

നെല്ല് ഗോതമ്പിനും എല്ലാ ധാന്യങ്ങൾക്കും  
12 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക

വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്

വഴുതന ( മുട്ടച്ചെടി ) ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ  
പച്ചക്കറികൾക്കും  
10 അല്ലെങ്കിൽ 12 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



ചെടികൾ ആരോഗ്യകരമല്ലെങ്കിലോ പ്രാണികൾ,  
കീടങ്ങൾ, പുഴുക്കൾ എന്നിവയാൽ  
ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ബാക്ടീരിയൽ  
രോഗങ്ങളോ വൈറൽ രോഗങ്ങളോ  
ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, 7 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ 3  
തവണ മാത്രം തളിക്കുക.

**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

ക്ലസ്റ്റർ ബീൻസിനും മറ്റ് പരിഷ്കൃത സസ്യങ്ങൾക്കും,  
വിളകൾ 12 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ  
തളിക്കൽ ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

വഴുതനങ്ങയ്ക്കും മറ്റ് പുച്ചെടികൾക്കും  
7 അല്ലെങ്കിൽ 8 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

ബംഗാൾ പയർ, എളുപ്പ്, മറ്റ് 90 ദിവസത്തെ വിളകൾ  
എന്നിവയ്ക്ക് 12 അല്ലെങ്കിൽ 15  
ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

നിലക്കടല, സൂര്യകാന്തി, മറ്റ് എണ്ണക്കുരു സസ്യങ്ങൾ  
എന്നിവയ്ക്ക് 12 അല്ലെങ്കിൽ 15  
ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

ഉള്ളിക്കും മറ്റ് റൂട്ട് പച്ചക്കറികൾക്കും  
12 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

വാഴപ്പഴം, പപ്പായ , കൊക്കോ ചെടികൾക്ക്  
12 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക

വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്

കാപ്പി, ചായ, മറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാന്റേഷനുകൾ  
എന്നിവയ്ക്കായി 12 അല്ലെങ്കിൽ 15  
ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ ആവശ്യമാണ്.



രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക

വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്

തെങ്ങ്, അർക്കനട്ട്, കൊക്കോ, പന എന്നിവയ്ക്കും  
എല്ലാ ഉയരമുള്ള മരങ്ങൾക്കും 15 അല്ലെങ്കിൽ 30  
ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ ആവശ്യമാണ്.



രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക

വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്

മാതളനാരങ്ങ, പേര, മറ്റ് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ  
എന്നിവയ്ക്ക് 15 അല്ലെങ്കിൽ 30  
ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

റോസ്, ജമന്തി, മറ്റ് പുഷ്പങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്  
7 അല്ലെങ്കിൽ 8 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, മറ്റ് റൂട്ട് പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയ്ക്ക്  
12 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

കരിമ്പിനും മറ്റ് ഒരു വർഷത്തെ വിളകൾക്കും  
15 അല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

മത്തങ്ങയ്ക്കും മറ്റ് വള്ളിച്ചെടികൾക്കും  
12 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

കരേല, സ്നേക്ക് ഗാർഡ്, റിഡ്ഡ് ഗാർഡ്, മറ്റ്  
വള്ളിച്ചെടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് 12 അല്ലെങ്കിൽ 15  
ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

ഉരട് ധാൽ ( കറുത്ത ഗ്രാം ) മുങ്ങി ധാലും മറ്റ് ധാലും  
12 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

നാരങ്ങ, മുരിങ്ങ, മറ്റ് പച്ചക്കറി മരങ്ങൾ  
എന്നിവയ്ക്ക് 15 അല്ലെങ്കിൽ 30  
ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

ചോളം, സോർഗം , മറ്റ് തിന വിളകൾ എന്നിവയ്ക്ക്  
12 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

കാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട്, മുളളങ്കി, ടേണിപ്പ് മുതലായവയ്ക്ക്.  
12 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക

വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കോളിഫ്ലവർ മുതലായവയ്ക്ക്.  
12 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക

വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്

മല്ലിയിലയ്ക്കും മറ്റ് ഇലക്കറികൾക്കും  
10 അല്ലെങ്കിൽ 12 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക

വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്

സപ്പോട്ട , നെല്ലിക്ക , മറ്റ് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ  
എന്നിവയ്ക്ക്  
15 അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

ആപ്പിൾ, പിയർ, മറ്റ് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്  
15 അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

മുളക്, പരുത്തി, മറ്റ് 6 മാസ വിളകൾ എന്നിവയ്ക്ക്  
15 അല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



**രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കുക  
വളരെ ഉയർന്ന വിളവ്**

തണ്ണിമത്തൻ, കസ്കൂരി തണ്ണിമത്തൻ, മറ്റ് 60  
ദിവസത്തെ വിളകൾ എന്നിവയ്ക്ക്  
10 അല്ലെങ്കിൽ 12 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിക്കൽ  
ആവശ്യമാണ്.



ചെടികൾ ആരോഗ്യകരമല്ലെങ്കിലോ പ്രാണികൾ,  
കീടങ്ങൾ, പുഴുക്കൾ എന്നിവയാൽ  
ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ബാക്ടീരിയൽ  
രോഗങ്ങളോ വൈറൽ രോഗങ്ങളോ  
ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, 7 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ 3  
തവണ മാത്രം തളിക്കുക.