

गोपंचंगा

वनस्पतींची छायाचित्रे आणि फवारणीचे वेळापत्रक

(डीलॉग टेक्नॉलॉजीज, चेन्नई - ६०००३३ यांच्याकडून)

रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

भात, गहू आणि सर्व धान्यांसाठी
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

वांग्याव्यतिरिक्त इतर सर्व भाज्यांसाठी
दर १० किंवा १२ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

गवार आणि डाळीच्या इतर जातींच्या वनस्पतींसाठी, पिके
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



झाडे अशक्त असल्यास किंवा कीटक, कीड, अब्ब्या यांचा प्रादुर्भाव झाल्यास किंवा त्यांना जिवाणूजन्य वा विषाणूजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यास, दर ७ दिवसांनी एकदा, फक्त ३ वेळा फवारणी करा.

रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

वांगी आणि इतर फुलांच्या वनस्पतींसाठी
दर ७ किंवा ८ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

हरभरा, तीळ आणि इतर ९० दिवसांच्या पिकांसाठी
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

भुईमूग, सूर्यफूल आणि इतर तेलबिया वनस्पतींसाठी
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

कांद्यासाठी आणि इतर कंद भाज्यांसाठी
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

केळी, पपई आणि कोकोच्या झाडांसाठी
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

कॉफी, चहा आणि इतर इस्टेट मळ्यांसाठी
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

नारळ, अर्कानट, कोको आणि पाम आणि सर्व उंच झाडांसाठी
दर १५ किंवा ३० दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

डाळिंब, पेरू आणि इतर फळझाडांसाठी
दर १५ किंवा ३० दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

गुलाब, झेंडू आणि इतर फुलझाडांसाठी
दर ७ किंवा ८ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

आले, हळद आणि इतर कंदमुळांसाठी
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

ऊस आणि इतर एक वर्षाच्या पिकांसाठी
दर १५ किंवा २० दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

भोपळा आणि इतर वेलवर्गीय भाज्यांसाठी
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

कारले, स्नेक गार्ड, रिज गार्ड आणि इतर वेलींसाठी
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

उडीद डाळ (काळाग्राम) मूग डाळ आणि इतर डाळ
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

लिंबू, शेवगा आणि इतर भाजीपाल्याच्या झाडांसाठी
दर १५ किंवा ३० दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

मका, ज्वारी आणि इतर बाजरीच्या पिकांसाठी
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

गाजर, बीट, मुळा, सलगम इत्यादींसाठी.
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

बटाटा, फुलकोबी इत्यादींसाठी.
दर १२ किंवा १५ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

कोथिंबीर आणि इतर पालेभाज्यांसाठी
दर १० किंवा १२ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

सपोटा , आवळा आणि इतर फळझाडांसाठी
दर १५ किंवा ३० दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

सफरचंद, नाशपाती आणि इतर फळझाडांसाठी
दर १५ किंवा ३० दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

मिरची, कापूस आणि इतर ६ महिन्यांच्या पिकांसाठी
दर १५ किंवा २० दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



रासायनिक कीटकनाशके टाळा

अत्यंत उच्च उत्पन्न

टरबूज, खरबूज आणि इतर ६० दिवसांच्या पिकांसाठी
दर १० किंवा १२ दिवसांनी फवारणी करणे आवश्यक आहे.



झाडे अशक्त असल्यास किंवा कीटक, कीड, अळ्या यांचा प्रादुर्भाव झाल्यास
किंवा त्यांना जिवाणूजन्य वा विषाणूजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यास, दर ७
दिवसांनी एकदा, फक्त ३ वेळा फवारणी करा.