

ಪಂಚಗವ್ಯ

ಸಸ್ಯಗಳ ಪಿಕ್ಚುರಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು

(ಡ್ರಾಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಚೆನ್ನೈ - 600033 ನಿಂದ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಭತ್ತ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಬದನೆಕಾಯಿ (ಮೊಟ್ಟೆ ಗಿಡ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ

10 ಅಥವಾ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಲ್ ವಿಧದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ಬೆಳೆಗಳು
12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ
7 ಅಥವಾ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕಡಲೆ ಕಾಳು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ 90 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ನೆಲಗಡಲೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೇರು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಬಾಳೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಗಿಡಗಳಿಗೆ

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತೋಟಗಳಿಗೆ

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅರ್ಕನಟ್, ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಗೆ - ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚಿ.

15 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ದಾಳಿಂಬೆ, ಪೇರಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ - ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚಿ.

15 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಗುಲಾಬಿ, ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ

7 ಅಥವಾ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೇರು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಇತರ 1 ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ

15 ಅಥವಾ 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕರೇಲಾ, ಸ್ನೇಕ್ ಗಾರ್ಡ್, ರಿಡ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಉರಾದ್ ಧಲ್ (ಬ್ಲಾಕ್‌ಗ್ರಾಮ್) ಮೂಂಗ್ ಧಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾಲ್‌ಗಾಗಿ

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ನಿಂಬೆ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿ ಮರಗಳಿಗೆ - ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚಿ.

15 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಜೋಳ, ಸೊರ್ಗಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರುಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಟರ್ನಿಪ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ.

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಹೂಕೋಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ.

12 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ

10 ಅಥವಾ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಸಪೋಟಾ, ಆಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ - ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸಿ

15 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ನೇಬು, ಪೇರಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ - ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚಿ.

15 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ 6 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ

15 ಅಥವಾ 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 60 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ

10 ಅಥವಾ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯ.



PGLOM ಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ 2 ರ ಸಾರ.

2. ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಮರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಆರಂಭ: ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು/ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ PGLOM ಅನ್ನು ಅದರ ಜೀವನದ 12/15 ನೇ ದಿನದಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಮರಗಳಿಗೆ ಅದರ ಜೀವನದ 3 ನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ.

2.1. ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ:

10.1.1 ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ (90/120 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳು) ಮೊದಲ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ Dlog Technologies PGLOM ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಂತರ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ.

2.1.2. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ 10 / 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ Dlog Technologies PGLOM ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಂತರ 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ.

2.2. ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ: (ರೋಗ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದರೆ):

2.2.1. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ (90/120 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳು) ಮೊದಲ 3 ಅಥವಾ 4 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ 4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ Dlog Technologies PGLOM ಸಿಂಪಡಿಸಿ. (ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ). ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಂತರ 10/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ.

2.2.2. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳು/ಮರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು 3 / 5 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ 4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ Dlog Technologies PGLOM ಸಿಂಪಡಿಸಿ. (ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳು/ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ). ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಂತರ 15 / 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ.

2.3. ಬೆಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ:

2.3.1. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ (90/120 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳು) 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡ್ಲಾಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ PGLOM ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2.3.2. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ Dlog Technologies PGLOM ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2.3.3. ಸಸ್ಯಗಳು/ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ PGLOM ಅನ್ನು 7 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಮರಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ 15 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PGLOM ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಡಿ/ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.